

登録番号	プロトコール名			
C16-68	胃癌トリフルリジン・チピラシル単独療法			
診療科	腫瘍内科	1クールの日数	28 日	
審査日	2019年10月28日	所要時間	-	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	切除不能・再発胃癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与法	投与日(d1, d8等)
1	トリフルリジン・チピラシル(ロンサーフ)	70 mg/m ²	p.o.	d1-5, d8-12
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Shitara et al. Trifluridine/tipiracil versus placebo in patients with heavily pretreated metastatic gastric cancer (TAGS): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 19:1437-1448.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	<p>トリフルリジン・チピラシルの投与量は体表面積に合わせて以下の投与量とする。</p> <p>1.07m²未満:35mg/回(70mg/日)</p> <p>1.07m²以上~1.23m²未満:40mg/回(80mg/日)、1.23m²以上~1.38m²未満:45mg/回(90mg/日)</p> <p>1.38m²以上~1.53m²未満:50mg/回(100mg/日)、1.53m²以上~1.69m²未満:55mg/回(110mg/日)</p> <p>1.69m²以上~1.84m²未満:60mg/回(120mg/日)、1.84m²以上~1.99m²未満:65mg/回(130mg/日)</p> <p>1.99m²以上~2.15m²未満:70mg/回(140mg/日)、2.15m²以上:75mg/回(150mg/日)</p> <p>【投与開始・再開、休業、減量基準】添付文書の記載に従う。</p>			

プロトコールに関する解説
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
胃癌トリフルリジン・チピラシル単独療法		28 日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1-5, 8-12	① ロンサーフ 70 mg/m ² /day 1日2回朝夕食後 ロンサーフの投与量は体表面積に合わせて以下の投与量とする。 1.07m ² 未満: 35mg/回(70mg/日) 1.07m ² 以上~1.23m ² 未満: 40mg/回(80mg/日) 1.23m ² 以上~1.38m ² 未満: 45mg/回(90mg/日) 1.38m ² 以上~1.53m ² 未満: 50mg/回(100mg/日) 1.53m ² 以上~1.69m ² 未満: 55mg/回(110mg/日) 1.69m ² 以上~1.84m ² 未満: 60mg/回(120mg/日) 1.84m ² 以上~1.99m ² 未満: 65mg/回(130mg/日) 1.99m ² 以上~2.15m ² 未満: 70mg/回(140mg/日) 2.15m ² 以上: 75mg/回(150mg/日)	内服	-
プロトコール 適応時 表示コメント	【投与開始・再開、休薬、減量基準】添付文書の記載に従う。		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄:)		