

登録番号	プロトコール名			
C18-60	大腸癌Ramcirumab+FOLFIRI療法(外来)			
診療科	腫瘍内科	1クールの日数	14日	
審査日	2016年8月29日	所要時間	210分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	大腸癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	ラムシルマブ(サイラムザ)・RAM	8mg/kg	CV	d1
2	レボホリナート(レボホリナート)・1-LV	200mg/m2	d.i.v.	d1
3	イリノテカン(トポテシン)・CPT-11	180mg/m2	d.i.v.	d1
4	フルオロウラシル(5-FU)・5-FU	400mg/m2	i.v.	d1
5	フルオロウラシル(5-FU)・5-FU	2400mg/m2	c.i.v	d1(46hr)
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	1. Tabernero J et al. Ramucirumab versus placebo in combination with second-line FOLFIRI in patients with metastatic colorectal carcinoma that progressed during or after first-line therapy with bevacizumab, oxaliplatin, and a fluoropyrimidine (RAISE): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 study. Lancet Oncol 2015; 16: 499-508.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
大腸癌Ramcirumab+FOLFIRI療法(外来)		14日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1	レスタミン錠50mg Rp.1生食点滴開始と同時に内服 ① 生食100mL レスタミン錠10mg 5錠内服 (①の点滴開始と同時) ② 生食250mL+サイラムザ 8mg/kg 調製完了後13時間以内に投与完了 0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用 2回目以降は30分に短縮可能。 ③ 生食 50mL(フラッシュ用) ④ 5%ブドウ糖液50mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg ⑤ 5%ブドウ糖液250mL+レボホリナート200mg/m ² ⑥ 5%ブドウ糖液250mL+トポテシン180mg/m ² ⑤と⑥は同時滴下開始 ⑦ 5%ブドウ糖液+5-FU 400mg/m ² 計50mL ⑧ 5%ブドウ糖液50mL(フラッシュ) ⑨ 5%ブドウ糖液100mL+5-FU 2400mg/m ² 携帯用ポンプで全量100mL(46hr)に調製	内服 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射	— 30分 60分 5分 15分 120分 90分 5分 5分 2760分
day3	① ヘパフラッシュ1000単位	中心静脈注射	5分
プロトコール 適応時 表示コメント	Rp.1点滴開始と同時にレスタミン錠50mg内服。 サイラムザは0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用		
照射併用時 照射線量			