

登録番号	プロトコール名			
C18-61-1	大腸癌ベバシズマブ+FOLFOXIRI療法(入院)			
診療科	腫瘍内科	1クールの日数	14日	
審査日	2017年3月27日	所要時間	1440分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	大腸癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1, d8等)
1	ベバシズマブ(アバスタチン)・Bev	5mg/kg	d.i.v.	d1
2	オキサリプラチン(エルプラット)・L-OHP	85mg/m2	d.i.v.	d1
3	イリノテカン(トポテシン)・CPT-11	165mg/m2	d.i.v.	d1
4	フルオロウラシル(5-FU)・5-FU	3200mg/m2	d.i.v.	d1-3
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	1. Cremolini C, Loupakis F, Antoniotti C et al. FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer: updated overall survival and molecular subgroup analyses of the open-label, phase 3 TRIBE study. Lancet Oncol 2015; 16: 1306-1315. 1. Loupakis F, Cremolini C, Masi G et al. Initial therapy with FOLFOXIRI and bevacizumab for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2014; 371: 1609-1618.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
大腸癌ベバシズマブ+FOLFOXIRI療法(入院)		14日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1	① 生食50mL(プライミング用) ② 生理食塩液100mL+アバステチン 5mg/kg 初回は90分投与、2回目以降は問題なければ60分投与可能 さらに問題なければ30分投与可能 ③ 生理食塩液50mL(フラッシュ用) ④ 5%ブドウ糖液50mL+アロキシ0.75mg+デキササート6.6mg ⑤ 5%ブドウ糖液250mL+トポテシン165mg/m2 ⑥ 5%ブドウ糖液250mL+レボホリナート200mg/m2 ⑦ 5%ブドウ糖液250mL+エルプラット85mg/m2 ⑥と⑦は同時滴下 ⑧ 5%ブドウ糖液500mL+5-FU 3200mg/m2 イメンドカプセル125mg 抗がん薬投与1時間～1時間30分前に内服	中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 中心静脈注射 内服	— 90分 5分 15分 60分 120分 120分 48時間
d3	① 5%ブドウ糖液50mL(フラッシュ用) ② ヘパフラッシュ1000単位	中心静脈注射 中心静脈注射	5分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント	最大12コースまでとする。 Day2,3にイメンド80mg内服。		
照射併用時 照射線量	グレイ(備考欄:)		