

登録番号	プロトコール名			
C18-68	大腸癌SIRB療法			
診療科	腫瘍内科、総合外科	1クールの日数	21日	
審査日	2018年4月23日	所要時間	205分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	進行再発大腸がん	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし、 <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	イリノテカン(トポテシン)・CPT-11	150 mg/m2	d.i.v.	d1
2	ベバシズマブ(アバスタチン)・Bmab	7.5 mg/kg	d.i.v.	d1
3	S-1(ティーエスワン)・S-1	80 mg/m2	p.o.	d1-14
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Yamada et al. S-1 and irinotecan plus bevacizumab versus mFOLFOX6 or CapeOX plus bevacizumab as first-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer (TRICOLORE): a randomized, open-label, phase 3, non-inferiority trial. Ann Oncol. 2017 Dec 27.[Epub ahead of print]			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	【減量基準】 CPT-11:Level 0 = 150mg/m2, Level -1 = 125mg/m2, Level -2 = 100mg/m2 S-1:Level 0 = 80mg/m2/day, Level -1 = 66mg/m2/day			

プロトコールに関する解説
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数									
大腸癌SIRB療法		21日									
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間								
day1	① 生食 50mL プライミング用	点滴注射									
	② 生食 100mL+アバステン 7.5 mg/kg 初回は90分で投与。 2回目以降問題なければ60分で投与、 さらに問題なければ30分で投与可。	点滴注射	90分								
	③ 生食 50mL フラッシュ用	点滴注射	5分								
	④ 生食 50mL+アロキシ 0.75 mg+デキサート 6.6 mg	点滴注射	15分								
	⑤ ブドウ糖注5% 250mL+トポテシン 150 mg/m ²	点滴注射	90分								
	⑥ 生食 50mL フラッシュ用	点滴注射	5分								
day1-14	S-1 80 mg/m ² /day, 朝夕2回に分けて食後投与 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">体表面積</td> <td style="text-align: center;">TS-1投与量(テガフル相当量)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.25m²未満</td> <td style="text-align: center;">40mg/回 × 2/day (80mg/day)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.25m²以上～1.5m²未満</td> <td style="text-align: center;">50mg/回 × 2/day (100mg/day)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.5m²以上</td> <td style="text-align: center;">60mg/回 × 2/day (120mg/day)</td> </tr> </table>	体表面積	TS-1投与量(テガフル相当量)	1.25m ² 未満	40mg/回 × 2/day (80mg/day)	1.25m ² 以上～1.5m ² 未満	50mg/回 × 2/day (100mg/day)	1.5m ² 以上	60mg/回 × 2/day (120mg/day)	経口	
体表面積	TS-1投与量(テガフル相当量)										
1.25m ² 未満	40mg/回 × 2/day (80mg/day)										
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満	50mg/回 × 2/day (100mg/day)										
1.5m ² 以上	60mg/回 × 2/day (120mg/day)										
プロトコール 適応時 表示コメント	S-1 80 mg/m ² /day 分2経口投与。										
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄:)										