

登録番号	プロトコール名				
C18-73	大腸癌CapeIRI+Bev療法				
診療科	腫瘍内科	1クールの日数	21日		
審査日	2018年10月29日	所要時間	205分	適応外使用	<input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり
適応病名	進行再発大腸がん		放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他( )				
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他( )				
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)	
1	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	div	d1	
2	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	div	d1	
3	カペシタビン	1600 mg/m <sup>2</sup>	po	d1-14	
4					
5					
6					
7					
8					
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 )				
ガイドライン文献名	Xu et al. Modified XELIRI (capecitabine plus irinotecan) versus FOLFIRI (leucovorin, fluorouracil, and irinotecan), both either with or without bevacizumab, as second-line therapy for metastatic colorectal cancer (AXEPT): a multicentre, open-label, randomised, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19:660-671.				
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	原法はCPT-11 200 mg/m <sup>2</sup> だが、国内承認用量に合わせた。				

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

## がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
大腸癌CapeIRI+Bev療法		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1	① 生食 50mL プライミング用	点滴注射	
	② 生食 100mL+アバスチン 7.5 mg/kg 初回は90分で投与。 2回目以降問題なければ60分で投与、 さらに問題なければ30分で投与可。	点滴注射	90分
	③ 生食 50mL フラッシュ用	点滴注射	5分
	④ 生食 50mL+アロキシ 0.75 mg+デキサート 6.6 mg	点滴注射	15分
	⑤ ブドウ糖注5% 250mL+トポテシン 150 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	90分
	⑥ 生食 50mL フラッシュ用	点滴注射	5分
day1-14	カペシタビン 1600 mg/m <sup>2</sup> , 朝夕2回に分けて	経口	
プロトコール 適応時 表示コメント	カペシタビン 1600 mg/m <sup>2</sup> 朝夕2回に分けて(d1-14)		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄: )		