

登録番号	プロトコール名			
C50-87	乳癌アベマシクリブ療法(アロマターゼ阻害剤併用)			
診療科	総合外科	1クールの日数	28日	
審査日	2019年2月25日	所要時間	—	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	手術不能又は再発乳癌		放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟 <input type="checkbox"/> その他( )			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> その他( )			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	アベマシクリブ(ベージニオ)	300mg	po	d1-28
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 )			
ガイドライン文献名	J Clin Oncol. 2017 Nov 10;35(32):3638-3646.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	<p>内分泌療法剤との併用において、通常、成人にはアベマシクリブとして1回150 mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。</p> <p><b>【増減量基準】</b>  1段階減量は100 mg 1日2回、2段階減量は50 mg 1日2回。</p> <p>アナストロゾール:1日1回1mg連日経口投与。  レトロゾール:1日1回2.5mg連日経口投与。</p>			

プロトコールに関する解説
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>

## がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
乳癌アバマシクリブ療法(アロマターゼ阻害剤併用)		28日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1-28	① <span style="color: red;">ベージニオ</span> 150mg 1日2回	内服	—
プロトコール 適応時 表示コメント	アナストロゾール:1日1回1mg連日経口投与。 レトロゾール:1日1回2.5mg連日経口投与。		
照射併用時 照射線量	グレイ(備考欄: )		