

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------|--|--|
| 登録番号 | プロトコール名 | | | |
| C53-31 | 子宮頸癌(進行・再発) TP療法 | | | |
| 診療科 | 婦人科 | 1クールの日数 | 21日 | |
| 審査日 | 2015年5月25日 | 所要時間 | 1440分 | 適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり |
| 適応病名 | 子宮頸癌 | 放射線療法 | <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり | |
| 実施部署 | <input type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他() | | | |
| 適応分類 | <input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他() | | | |
| 番号 | 抗がん薬名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与日(d1、d8等) |
| 1 | パクリタキセル(タキソール)・T | 135mg/m2 | div. | d1 |
| 2 | シスプラチン(シスプラチン、ランダ)・P | 50mg/m2 | div. | d2 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| エビデンスレベル | <input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6) | | | |
| ガイドライン文献名 | <ul style="list-style-type: none"> ●Phase III Study of Cisplatin With or Without Paclitaxel in Stage IVB, Recurrent, or Persistent Squamous Cell Carcinoma of the Cervix: A Gynecologic Oncology Group Study David H. Moore. VOLUME 22 NUMBER 15 AUGUST 1 2004 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY ●Phase III Trial of Four Cisplatin-Containing Doublet Combinations in Stage IVB, Recurrent, or Persistent Cervical Carcinoma: A Gynecologic Oncology Group Study Bradley J. Monk. VOLUME 27 NUMBER 28 OCTOBER 1 2009 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | | | |
| その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など) | | | | |

| |
|----------------------------|
| プロトコールに関する解説 |
| <p>プロトコールに関する解説はありません。</p> |

がん化学療法処方

| プロトコール名 | | 1クールの日数 | |
|-------------------------|--|--|---|
| 子宮頸癌(進行・再発) TP療法 | | 21日 | |
| 投与日 | 薬品名(※赤字は抗がん薬) | 投与経路 | 投与時間 |
| day1 | ① 生理食塩液50ml + アロキシ0.75mg + デキサート13.2mg + ガスター20mg ② 生理食塩液100ml ③ ブドウ糖注5%250ml + パクリタキセル 67.5mg/m ² インラインフィルターを用いて投与する ④ ブドウ糖注5%250ml + パクリタキセル 67.5mg/m ² インフラインフィルターを用いて投与する | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 10分 30分 720分 720分 |
| day2 | ① 生理食塩液1L + 硫酸Mg補正液1mEq/ml 8ml 側管より投与。前日のパクリタキセル持続点滴終了の4時間前から ② 生理食塩液50ml + デキサート9.9mg ③ 生理食塩液500ml + シスプラチン 50mg/m ² ④ ラシックス20mg ⑤ ソルデム3A 500ml ⑥ ソルデム3A 500ml ⑦ ソルデム3A 500ml ⑧ ソルデム3A 500ml | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 240分 15分 120分 120分 240分 240分 240分 |
| day3 | ① 生理食塩液50ml + デキサート6.6mg ② ソルデム3A 500ml ③ ソルデム3A 500ml ④ ソルデム3A 500ml ⑤ ソルデム3A 500ml | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 15分 240分 240分 240分 240分 |
| プロトコール 適応時 表示コメント | パクリタキセル開始30分前にレスタミン50mg内服 パクリタキセルはインラインフィルターを用いて投与する。 生理食塩液+硫酸Mgは前日のパクリタキセル持続点滴が終了する4時間前から開始する。側管から投与する。 D2シスプラチン開始60~90分前にイメンド125mg内服 D3,D4朝食前にイメンド80mg内服 | | |
| 照射併用時 照射線量 | グレイ (備考欄:) | | |