

登録番号	プロトコール名			
C56-83	卵巣癌ノギテカン+ベバシズマブ併用療法			
診療科	婦人科	1クールの日数	21日	
審査日	2017年3月27日	所要時間	150分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	卵巣癌、卵管癌、腹膜癌		放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	ノギテカン(ハイカムチン)NOG	1.25mg/m ²	div	1～5日目
2	ベバシズマブ(アバスチン)・Bev	15mg/kg	div	1日目
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Bevacizumab Combined With Chemotherapy for Platinum-Resistant Recurrent Ovarian Cancer: The AURELIA Open-Label Randomized Phase III Trial(Eric Pujade-Lauraine, JCO 2014)			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
卵巣癌ノギテカン+ベバシズマブ併用療法		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1	① 生理食塩液50mL(プライミング用) ② アバスチン注 15mg/kg+生理食塩液100mL 投与時間はinfusion reactionなければ2回目の投与以降は60分→30分と段階的に短縮可能 ③ 生理食塩液50mL(フラッシュ用) ④ デキサート6.6mg+生理食塩液50mL ⑤ 生理食塩液50mL(フラッシュ用) ⑥ ハイカムチン注射用 1.25mg/m ² +生理食塩液100mL ⑦ 生理食塩液50mL(フラッシュ用)	点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射	- 90分 5分 15分 5分 30分 5分
day2~5	① デキサート6.6mg+生理食塩液50mL ② 生理食塩液50mL(フラッシュ用) ③ ハイカムチン注射用 1.25mg/m ² +生理食塩液100mL ④ 生理食塩液50mL(フラッシュ用)	点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射	15分 5分 30分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント	吐き気止め必要時、d1は点滴④、d2-5は点滴①に混注		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄:)		