

登録番号	プロトコール名			
C67-19	尿路上皮癌 ペムブロリズマブ単剤療法			
診療科	泌尿器科、腫瘍内科	1クールの日数	21日	
審査日	2018年1月29日	所要時間	35分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	尿路上皮癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他( )			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他( )			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	200mg/body	div	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 )			
ガイドライン文献名	J. Bellmunt et al. Pembrolizumab as Second-Line Therapy for Advanced Urothelial Carcinoma. N Engl J Med 2017;376:1015-26.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

# がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
尿路上皮癌 ペムブロリズマブ単剤療法		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1	① 生理食塩水 50mL(プライミング用) ② 生理食塩水 50mL+キイトルーダ200mg 0.2μmインラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了 ③ 生理食塩水 50mL(フラッシュ用)	点滴静注 点滴静注  点滴静注	— 30分  5分
プロトコール 適応時 表示コメント			
照射併用時 照射線量	グレイ(備考欄: )		