

登録番号	プロトコール名			
C76-55	頭頸部癌 Pembrolizumab + CDDP+5-FU療法			
診療科	腫瘍内科、耳鼻咽喉・頭頸部外科	1クールの日数	21 日	
審査日	2020年1月27日	所要時間	1440分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	切除不能・再発頭頸部癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1, d8等)
1	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	200 mg/body	点滴	d1
2	シスプラチン(シスプラチン)	100 mg/m2	点滴	d1
3	5-FU (5-FU)	1,000 mg/m2	点滴	d1-4
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Burtness et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019 394:1915-28.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	Pembrolizumab + CDDP+5-FU療法は6コースまで。			

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
頭頸部癌 Pembrolizumab + CDDP+5-FU療法		21 日	
投与日	薬品名 (※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1	① ラクテック 500 ml ② ラクテック 500 ml ③ ラクテック 500 ml	点滴注射 点滴注射 点滴注射	120分 120分 120分
d2	① 生理食塩液『ヒカリ』50ml プライミング用 ② キイトルーダ 200 mg/body + 生食50mL 0.2又は0.22 μ mインラインフィルターを使用。 ③ 生理食塩水『ヒカリ』50ml フラッシュ用 ④ 5-FU 1,000 mg/m ² + 生理食塩液(テルモ)500 ml ⑤ ソルデム3A 1,000 ml + 10%NaCl 20 ml + 硫酸Mg補正液1mEq/ml 8 ml ⑥ 生理食塩水『ヒカリ』50ml フラッシュ用 ⑦ プロイメンド点滴静注用150 mg + 生理食塩液プラボ(大塚) 100 ml ⑧ グラニセトロン点滴静注バッグ1 mg/50 ml [HK] + デキサート 9.9 mg ⑨ マンニトール20% 100 ml ⑩ シスプラチン 100 mg/m ² + 生理食塩液(テルモ)300 ml ⑪ ソルデム3A 1,000 ml + 10%NaCl 20 ml + 硫酸Mg補正液1mEq/ml 8 ml	点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射	- 30分 5分 1,440分 240分 5分 30分 15分 30分 120分 240分
d3	① 5-FU 1,000 mg/m ² + 生理食塩液(テルモ)500 ml	点滴注射	1,440分
d4	① 5-FU 1,000 mg/m ² + 生理食塩液(テルモ)500 ml	点滴注射	1,440分
d5	① 5-FU 1,000 mg/m ² + 生理食塩液(テルモ)500 ml ② 生理食塩水『ヒカリ』50ml フラッシュ用	点滴注射 点滴注射	1,440分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント	Pembrolizumab + CDDP+5-FU療法は6コースまで。 診療科登録制(リスト参照)		
照射併用時 照射線量			