

登録番号	プロトコール名			
C90-43	多発性骨髄腫 VRd療法			
診療科	血液内科	1クールの日数	21日	
審査日	2017年8月28日	所要時間	1分	適応外使用 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり
適応病名	多発性骨髄腫	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1, d8等)
1	Bortezomib(ベルケイド®)・Bz	1.3 mg/m ²	s.c.	d1,4,8,11
2	Lenalidomide(レブラミド®)・Len	25 mg/body	p.o.	d1-14
3	Dexamethasone(レナデックス®)・DEX	20 mg/body	p.o.	d1,2,4,5,8,9,11,12
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Lancet 2017; 389: 519-27			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	【増減量の基準】添付文書に従う			

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
多発性骨髄腫 VRd療法		21日	
投与日	薬品名 (※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1,4,8,11	ベルケイド 1.3 mg/m ² + NS* ベルケイド1Vを生食1.2mLで溶解する。 2.5mg/mLの濃度に調製する。 投与の際は、同一コース内での 同じ部位への皮下注射は避け、 投与部位をローテーションする (右腹部→左腹部→右上腕 左上腕→右大腿→左大腿など)	皮下注	1分
d1,2,4,5,8,9, 11,12	レナデックス 20 mg	内服	朝食後
d1-14	レブラミド 25 mg * NS*: ベルケイド 1mgあたり0.4mLの生食で溶解	内服	朝食後
プロトコール 適応時 表示コメント	レナリドミド25mg/bodyをd1-14, デキサメタゾン20mg/bodyをd1,2,4,5,8,9,11,12に内服		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄:)		