

登録番号	プロトコール名			
C90-52	多発性骨髄腫 IRd療法			
診療科	血液内科	1クールの日数	28日	
審査日	2017年12月25日	所要時間	-	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	多発性骨髄腫	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他( )			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他( )			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与法	投与日(d1, d8等)
1	ixazomib (ニンラーロ®)・I	4mg	p.o.	d1,8,15
2	Lenalidomide (レブラミド®)・R	25mg	p.o.	d1-21
3	Dexamethasone (レナデックス®)・d	40mg	p.o.	d1,8,15,22
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 )			
ガイドライン文献名	N Engl J Med 2016;374:1621-34. 添付文書			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	添付文書の減量基準、開始基準に従う また、副作用出現時は適宜減量する			

プロトコールに関する解説
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>

# がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
多発性骨髄腫 IRd療法		28日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1,8,15 d1-21 d1,8,15,22	<b>ニンラーロ</b> 4mg <b>レブラミド</b> 25mg レナデックス 40mg  副作用出現時には適宜減量する。	内服 内服 内服	起床時 朝食後
プロトコール 適応時 表示コメント			
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄: )		