

登録番号	プロトコール名			
C90-60	多発性骨髄腫 イキサゾミブ維持療法(1-4C)			
診療科	血液内科	1クールの日数	28 日	
審査日	2020年5月18日	所要時間	-	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	多発性骨髄腫	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与法	投与日(d1, d8等)
1	ixazomib (ニンラーロ®)	3mg	PO	d1,8,15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Lancet 2019; 393: 253-64			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	多発性骨髄腫における自家造血幹細胞移植後の維持療法としてイキサゾミブは4サイクルまでは3mg、5サイクル以降は4mgとする。患者の状態により適宜減量する。			

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
多発性骨髄腫 イキサゾミブ維持療法(1-4C)		28 日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1,8,15	① イキサゾミブ 3mg 1日1回空腹時	内服	
プロトコール 適応時 表示コメント			
照射併用時 照射線量			