

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|--|--|
| 登録番号 | プロトコール名 | | | |
| C90076C1 | 多発性骨髄腫 DaraBd sc療法(9コース以降) | | | |
| 診療科 | 血液内科 | 1クールの日数 | 28日 | |
| 審査日 | 2021年6月28日 | 所要時間 | 5分 | 適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり |
| 適応病名 | 多発性骨髄腫 | 放射線療法 | <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり | |
| 実施部署 | <input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟 <input type="checkbox"/> その他() | | | |
| 適応分類 | <input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> その他() | | | |
| 番号 | 抗がん薬名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与日(d1、d8等) |
| 1 | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ (ダラキューロ配合皮下注) | 1800mg | 皮下注 | d1 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| エビデンスレベル | <input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6) | | | |
| ガイドライン文献名 | N Engl J Med 2016;375:754-66. Lancet Haematol. 2020 May;7(5):e370-e380. Br J Haematol. 2021 Mar;192(5):869-878. | | | |
| その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など) | ダラキューロ投与によるinfusion reactionを軽減させるために、本剤投与開始1～3時間前に副腎皮質ホルモン、解熱鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤を投与する。 | | | |

| | |
|--------------|--|
| プロトコールに関する解説 | |
| | |

がん化学療法処方

| プロトコール名 | | 1クールの日数 | |
|----------------------------|---|--------------|------|
| 多発性骨髄腫 DaraBd sc療法(9コース以降) | | 28日 | |
| 投与日 | 薬品名(※赤字は抗がん薬) | 投与経路 | 投与時間 |
| d1 | ① レナデックス 20mg、カロナール 400mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放 6mg § ダラキューロ投与1時間前までに内服。問題なければ15分前まで短縮可。 ② ダラキューロ配合皮下注 1800 mg 投与1時間前までにレナデックス20mg、カロナール400mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg内服。問題なければ15分前まで短縮可。 調製後4時間以内に投与完了。 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3～5分かけて投与する。 | 経口 皮下 | 3-5分 |
| プロトコール 適応時 表示コメント | ダラキューロ投与1時間前までにレナデックス20mg+d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg+カロナール400mg内服する。問題なければ15分前まで短縮可。 | | |
| 照射併用時 照射線量 | グレイ (備考欄:) | | |