

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
食道癌術前補助DCF療法		21日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
d0	本管 ① ラクテック注 500mL ② ラクテック注 500mL ③ ラクテック注 500mL		
d1	本管 ① ソルデム3A 1000mL + 10%塩化ナトリウム 20mL + 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 8mL ② 生食 50mL(フラッシュ用) ③ グラニセトロン1mgバッグ + デキサート 9.9mg + アロカリス235mg ④ 生食 250mL + ドセタキセル 70mg/m2 ⑤ マンニトールS 100mL ⑥ 生食 300mL + シスプラチン 70 mg/m2 遮光 ⑦ 生食 500mL + フルオロウラシル 750mg/m2 側管 ⑧ ソルデム3A 1000mL + 10%塩化ナトリウム 20mL + 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 8mL		
d2-4	本管 ① 生食 500mL + フルオロウラシル 750mg/m2		
d5	本管 ① 生食 500mL + フルオロウラシル 750mg/m2 ② 生食 50mL(フラッシュ用)		
コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・3コース施行 ・FNの1次予防にG-CSFを用いることを推奨 		

プロトコールに関する解説
<p>本療法は、食道癌で有効性が示された治療法です。臨床試験により、切除可能食道癌患者の術前療法としての、DCF療法の有効性が示されました。最も頻度の高い有害事象は好中球減少であり、グレード3-4の好中球減少はDCF群で85%にみられています。</p>