

| プロトコール名  |  | 1クールの日数 | 放射線治療   |
|----------|--|---------|---------|
| 食道癌 FP療法 |  | 28日     | ■なし □あり |
| 投与日      | 薬品名(※赤字は抗がん薬)  |         |         |
| 第0日目     | ① ラクテック注 500mL<br>② ラクテック注 500mL<br>③ ラクテック注 500mL   |         |         |
| 第1日目     | ① 生食1000mL + KCL注キット20mEq + 硫酸Mg補正液1mEq/ml 8mL<br>② 生食50ml(フラッシュ用)<br>③ グラニセトロン1mgバッグ + デキサート9.9mg + アロカリス235mg<br>④ 生食50mL(フラッシュ用)<br>⑤ マンニトールS 100mL<br>⑥ 生食300mL + シスプラチン80mg/m2<br>要遮光<br>⑦ 生食500mL + フルオロウラシル800mg/m2<br>⑧ 生食1000mL + KCL注キット20mEq + 硫酸Mg補正液1mEq/ml 8mL<br>側管より投与 |         |         |
| 第2-4日目   | ① 生食500mL + フルオロウラシル800mg/m2   |         |         |
| 第5日目     | ① 生食500mL + フルオロウラシル800mg/m2<br>② 生食50mL(フラッシュ用)   |         |         |
| コメント     |  |         |         |

| プロトコールに関する解説        |
|---------------------|
| プロトコールに関する解説はありません。 |