

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
大腸癌Ramcirumab+FOLFIRI療法(外来)		14日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
day1	レスタミン錠50mg Rp.1生食点滴開始と同時に内服 ① 生食100mL レスタミン錠10mg 5錠内服 (①の点滴開始と同時) ② 生食250mL+サイラムザ 8mg/kg 調製完了後13時間以内に投与完了 0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用 2回目以降は30分に短縮可能。 ③ 生食 50mL(フラッシュ用) ④ 5%ブドウ糖液50mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg ⑤ 5%ブドウ糖液250mL+レボホリナート200mg/m2 ⑥ 5%ブドウ糖液250mL+トポテシン180mg/m2 ⑤と⑥は同時滴下開始 ⑦ 5%ブドウ糖液+5-FU 400mg/m2 計50mL ⑧ 5%ブドウ糖液50mL(フラッシュ) ⑨ 5%ブドウ糖液100mL+5-FU 2400mg/m2 携帯用ポンプで全量100mL(46hr)に調製		
day3	① ヘパフラッシュ1000単位		
コメント	Rp.1点滴開始と同時にレスタミン錠50mg内服。 サイラムザは0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用		

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。