

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
大腸癌ベバシズマブ+FOLFOXIRI療法(外来)		14日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
d1	① 生食50mL(プライミング用) ② 生理食塩液100mL+アバスチン 5mg/kg 初回は90分投与、2回目以降は問題なければ60分投与可能 さらに問題なければ30分投与可能 ③ 生理食塩液50mL(フラッシュ用) ④ 5%ブドウ糖液50mL+アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg ⑤ 5%ブドウ糖液250mL+トポテシン165mg/m2 ⑥ 5%ブドウ糖液250mL+レボホリナート200mg/m2 ⑦ 5%ブドウ糖液250mL+エルプラット85mg/m2 ⑥と⑦は同時滴下 ⑧ 5%ブドウ糖液50mL(フラッシュ用) ⑨ 5%ブドウ糖液+5-FU 3200mg/m2 携帯用ポンプで全量130mL(48hr)に調整 イメンドカプセル125mg 抗がん薬1時間～1時間30分前に内服		
d3	① ヘパフラッシュ1000単位		
コメント	最大12コースまでとする。 Day2,3にイメンド80mg内服。		

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。