

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療								
大腸癌SIRB療法		21日	■なし、□あり								
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)										
day1	① 生食 50mL プライミング用 ② 生食 100mL+アパスチン 7.5 mg/kg 初回は90分で投与。 2回目以降問題なければ60分で投与、 さらに問題なければ30分で投与可。 ③ 生食 50mL フラッシュ用 ④ 生食 50mL+アロキシ 0.75 mg+デキサート 6.6 mg ⑤ ブドウ糖注5% 250mL+トポテシン 150 mg/m <sup>2</sup> ⑥ 生食 50mL フラッシュ用										
day1-14	S-1 80 mg/m <sup>2</sup> /day, 朝夕2回に分けて食後投与  <table border="0"> <tr> <td>体表面積</td> <td>TS-1投与量(テガフル相当量)</td> </tr> <tr> <td>1.25m<sup>2</sup>未満</td> <td>40mg/回 × 2/day (80mg/day)</td> </tr> <tr> <td>1.25m<sup>2</sup>以上~1.5m<sup>2</sup>未満</td> <td>50mg/回 × 2/day (100mg/day)</td> </tr> <tr> <td>1.5m<sup>2</sup>以上</td> <td>60mg/回 × 2/day (120mg/day)</td> </tr> </table>			体表面積	TS-1投与量(テガフル相当量)	1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回 × 2/day (80mg/day)	1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回 × 2/day (100mg/day)	1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回 × 2/day (120mg/day)
体表面積	TS-1投与量(テガフル相当量)										
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回 × 2/day (80mg/day)										
1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回 × 2/day (100mg/day)										
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回 × 2/day (120mg/day)										
コメント	S-1 80 mg/m <sup>2</sup> /day 分2経口投与。										

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。