

| プロトコール名 | | 1クールの日数 | 放射線治療 |
|-----------------------|---|---------|--|
| 肛門管癌 放射線併用CDDP+5-FU療法 | | 28日 | <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり |
| 投与日 | 薬品名(※赤字は抗がん薬) | | |
| day0 | ① ラクテック500mL ② ラクテック500mL ③ ラクテック500mL | | |
| day1 | ① フルオロウラシル 1000mg/m ² +生理食塩液500mL ①本管は24時間持続投与。 ② ソルデム3A1000mL+10%塩化ナトリウム20mL+硫酸Mg 8mEq ①と同時に側管投与 ③ 生理食塩液50mL(フラッシュ用) ①と同時に側管投与 ④ プロイメンド150mg+生理食塩液100mL ①と同時に側管投与 ⑤ グラニセトロンバッグ1mg+デキサート9.9mg ①と同時に側管投与 ⑥ マンニトール20%100mL ①と同時に側管投与 ⑦ シスプラチン 75mg/m ² +生理食塩液300mL ⑦シスプラチン側管投与中、①本管のフルオロウラシルは停止。 ⑧ ソルデム3A1000mL+10%塩化ナトリウム20mL+硫酸Mg 8mEq ①と同時に側管投与 | | |
| day2-4 | ① フルオロウラシル 1000mg/m ² +生理食塩液500mL ①本管は24時間持続投与。 | | |
| day5 | ① 生理食塩液50mL(フラッシュ用) | | |
| コメント | 放射線併用。 基本的にCCRT中に上記レジメンを2コース施行(4週毎)する。 | | |

| プロトコールに関する解説 | |
|---------------------|--|
| プロトコールに関する解説はありません。 | |