

プロトコール名	1クールの日数	放射線治療
胆道癌 GCS療法	14日	■なし □あり

投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)
day1	① ソルデム3A 500mL (メインルート Rp.1) ② ソルデム3A 500mL (メインルート Rp.2) ③ 生理食塩水 500mL (メインルート Rp.3) ④ グラニセトンバッグ1mg + デキサート6.6mg 1A + デキサート1.65mg 2A (側管ルート Rp.1) ⑤ <b>シスプラチン</b> 25mg/m <sup>2</sup> + 生食250mL (側管ルート Rp.2) ⑥ <b>ジェムザール</b> 1000mg/m <sup>2</sup> + 生食100mL (側管ルート Rp.3) ⑦ 生食50mL (側管ルート Rp.4 ラインフラッシュ)
day1	アプレピタントカプセル125mg 抗がん薬投与1時間～1時間半前に内服
day1-7	① <b>エスワンタイホウ</b> 80mg/m <sup>2</sup> /日 1.25m <sup>2</sup> 未満: 80mg/日 (-1レベル: 60mg/日) 1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満: 100mg/日 (-1レベル: 80mg/日) 1.5m <sup>2</sup> 以上: 120mg/日 (-1レベル: 100mg/日) ※Ccrが60 mL/min未満の場合はS-1を1段階減量して60mg/m <sup>2</sup> /bodyで投与
コメント	day1-7 S-1 80mg/m <sup>2</sup> 内服。Ccr 60mL/min未満の場合は減量して60mg/m <sup>2</sup> 。 day2,3にアプレピタント80mg内服。

プロトコールに関する解説