

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
肺癌(扁平上皮)CBDCA・nab-PTX+ペムブロリズマブ療法		21日	■なし、□あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
day1	① 生理食塩水 50mL(プライミング用) ② 生理食塩水 50mL+キイトルーダ200mg 0.22 μ mインラインフィルター使用 ③ 生理食塩水 50mL(フラッシュ用) ④ グラニセトロン点滴静注バッグ1mg+デキサート4.95mg ※ライン交換要 ⑤ 生理食塩水 50mL(フラッシュ用) ⑥ 生理食塩水 100mL+アブラキサン100mg/m2 インラインフィルター使用不可 ⑦ 生理食塩水 50mL(フラッシュ用) ⑧ 5%ブドウ糖液 250mL+カルボプラチン(AUC6) ⑨ 生理食塩水 50mL(フラッシュ用)		
day1	① イメンドカプセル125mg 抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服		
day8,15	① 生理食塩水 50mL(プライミング用) ② 生理食塩水 100mL+アブラキサン100mg/m2 インラインフィルター使用不可 ③ 生理食塩水 50mL(フラッシュ用)		
コメント	処方医要登録。Day2,3朝食後にイメンド80mg内服。4サイクル実施後、ペムブロリズマブ単独療法に移行。		

プロトコールに関する解説
<p>従来の標準治療であるカルボプラチン+パクリタキセルやカルボプラチン+nabパクリタキセルに免疫チェックポイント阻害薬のペムブロリズマブを併用することでより効果が得られます。毒性についてはペムブロリズマブを併用すると甲状腺機能異常や肺臓炎のような免疫関連有害事象の頻度が増えるため注意が必要です。</p>