

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| プロトコール名 | 1クールの日数 | 放射線治療 |
| 悪性黒色腫ダブラフェニブ・トラメチニブ併用療法 | 14日 | ■なし □あり |

| 投与日 | 薬品名(※赤字は抗がん薬) |
|-----|---------------|
|-----|---------------|

| | |
|-------|--|
| d1-14 | <p>① タフィンラーカプセル 150mg (朝 空腹時)</p> <p>② メキニスト錠 2mg (朝 空腹時)</p> <p>③ タフィンラーカプセル 150mg (夕 空腹時)</p> <p>用量調節</p> <p>・タフィンラーカプセル 通常投与量:1回150mg(1日2回) 1段階減量:1回100mg(1日2回) 2段階減量:1回75mg(1日2回) 3段階減量:1回50mg(1日2回) 4段階減量:投与中止</p> <p>・メキニスト錠 通常投与量:1回2mg(1日1回) 1段階減量:1回1.5mg(1日1回) 2段階減量:1回1mg(1日1回) 3段階減量:投与中止</p> |
|-------|--|

| | |
|------|--|
| コメント | |
|------|--|

| プロトコールに関する解説 |
|--------------|
|--------------|

| |
|---------------------|
| プロトコールに関する解説はありません。 |
|---------------------|