

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
子宮頸癌 Pembrolizumab(6週毎)維持療法		42日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
d1	① 生食50mL(プライミング用) ② 生食50mL + キイトルーダ 400mg 最終濃度は1~10mg/mLとする 投与時0.2~5 μmインラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了 ③ 生食50mL(フラッシュ用)		
コメント	子宮頸癌 TC+Pembrolizumab療法、または子宮頸癌 TP+Pembrolizumab療法後に使用		

プロトコールに関する解説
本療法は、化学療法歴のない(化学放射線療法としての投与歴は除く)、手術・放射線治療での根治治療の適応のない進行・再発子宮頸癌において、効果が示されている治療法です。臨床試験により、これまでの標準療法(パクリタキセル+シスプラチン±ペバシズマブ、パクリタキセル+カルボプラチン±ペバシズマブ)に比べ優れた治療成績が示され、化学療法歴のない、また手術・放射線療法での根治治療の適応のない進行・再発子宮頸癌における新しい標準治療と認識されています。グレード3以上の副作用は68.4%対64.1%でほぼ同等で、また免疫関連有害事象を13.4%で認めました。副作用が強い場合は、減量、減薬や休薬などの調整が必要になることがあります。