

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
子宮頸癌(進行・再発) TP療法		21日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
day1	① 生理食塩液50ml + アロキシ0.75mg + デキサート13.2mg + ガスター20mg ② 生理食塩液100ml ③ ブドウ糖注5%250ml + <b>パクリタキセル</b> 67.5mg/m2 インラインフィルターを用いて投与する ④ ブドウ糖注5%250ml + <b>パクリタキセル</b> 67.5mg/m2 インフラインフィルターを用いて投与する		
day2	① 生理食塩液1L + 硫酸Mg補正液1mEq/ml 8ml 側管より投与。前日のパクリタキセル持続点滴終了の4時間前から ② 生理食塩液50ml + デキサート9.9mg ③ 生理食塩液500ml + <b>シスプラチン</b> 50mg/m2 ④ ラシックス20mg ⑤ ソルデム3A 500ml ⑥ ソルデム3A 500ml ⑦ ソルデム3A 500ml ⑧ ソルデム3A 500ml		
day3	① 生理食塩液50ml + デキサート6.6mg ② ソルデム3A 500ml ③ ソルデム3A 500ml ④ ソルデム3A 500ml ⑤ ソルデム3A 500ml		
コメント	パクリタキセル開始30分前にレスタミン50mg内服 パクリタキセルはインラインフィルターを用いて投与する。 生理食塩液+硫酸Mgは前日のパクリタキセル持続点滴が終了する4時間前から開始する。側管から投与する。 D2シスプラチン開始60～90分前にイメンド125mg内服 D3,D4朝食前にイメンド80mg内服		

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。