

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
卵巣癌 毎週パクリタキセル+ベバシズマブ療法		28日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
day1、15	① 生理食塩液50ml(プライミング用) ② アバステチン注 10mg/kg+生理食塩液100mL 初回は90分、2回目60分、3回目以降30分で投与可 ③ 生理食塩液50ml(フラッシュ用) ④ デキサート13.2mg+ガスター20mg+生食50mL 点滴開始と同時にレスタミン錠10mgを5錠内服 ⑤ 生食100mL ⑥ パクリタキセル注 80mg/m ² +生理食塩液250ml ⑦ 生理食塩液50ml(フラッシュ用)		
day8、22	① デキサート13.2mg+ガスター20mg+生食50mL 点滴開始と同時にレスタミン錠10mgを5錠内服 ② 生食100mL ③ パクリタキセル注 80mg/m ² +生理食塩液250ml ④ 生理食塩液50ml(フラッシュ用)		
コメント	前投薬としてレスタミン錠10mgを5錠内服 ※適応は、卵管癌・腹膜癌を含む 適応外使用:ベバシズマブの卵巣癌での適応は1回15mg/kg3週後毎のため。		

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。