

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
再発・初発維持悪性神経膠腫へバシズマブ+テモゾロミド点滴療法		28日	<input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
d1	<ul style="list-style-type: none"> ① 生食50mL(プライミング用) ② 生食100mL + アバステチン 10mg/kg *初回は90分投与 (2回目以降は問題なければ60分投与、さらに問題なければ30分投与も可能とする) ③ 生食50mL(フラッシュ用) ④ グラニセトロン点滴静注バッグ1mg ⑤ 生食50mL(フラッシュ用) ⑥ 注射用水+テモダール注150mg/sq テモダール100mg(1V)につき、注射用水41mLで溶解。 払い出し容器は100mLボトル 但し、50mL以下はシリンジ ⑦ 生食50mL(フラッシュ用) 		
d2-5	<ul style="list-style-type: none"> ① グラニセトロン点滴静注バッグ1mg ② 生食50mL(フラッシュ用) ③ 注射用水+テモダール注150mg/sq テモダール100mg(1V)につき、注射用水41mLで溶解。 払い出し容器は100mLボトル 但し、50mL以下はシリンジ ④ 生食50mL(フラッシュ用) 		
d15	<ul style="list-style-type: none"> ① 生食50mL(プライミング用) ② 生食100mL + アバステチン 10mg/kg *初回は90分投与 (2回目以降は問題なければ60分投与、さらに問題なければ30分投与も可能とする) ③ 生食50mL(フラッシュ用) 		
コメント	1クール目で問題がなければ、TMZは2クール目より200mg/m ² に増量可。		

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。