

| プロトコール名                         |   | 1クールの日数 | 放射線治療   |
|---------------------------------|---|---------|---------|
| 頭頸部癌 Pembrolizumab+CBDCA+5-FU療法 |   | 21 日    | ■なし □あり |
| 投与日                             | 薬品名(※赤字は抗がん薬)   |         |         |
| d1                              | ① 生理食塩液『ヒカリ』50ml プライミング用<br>② <b>キイトルーダ</b> 200 mg/body +生食 50 mL<br>0.2又は0.22 μ mインラインフィルターを使用<br>③ 生理食塩水『ヒカリ』50ml フラッシュ用<br>④ 生理食塩液(テルモ)500 ml<br><b>5-FU</b> 1,000 mg/m2<br>⑤ 生理食塩液プラボ(大塚) 100 ml<br>プロイメンド点滴静注用150 mg<br>⑥ グラニセトロン点滴静注バッグ1 mg/50 ml [HK]<br>デキサート 4.95 mg<br>⑦ 生理食塩液 250 ml<br><b>カルボプラチン</b> AUC5<br>⑧ 生食 50 ml フラッシュ用 |         |         |
| d2                              | ① 生理食塩液(テルモ)500 ml<br><b>5-FU</b> 1,000 mg/m2   |         |         |
| d3                              | ① 生理食塩液(テルモ)500 ml<br><b>5-FU</b> 1,000 mg/m2   |         |         |
| d4                              | ① 生理食塩液(テルモ)500 ml<br><b>5-FU</b> 1,000 mg/m2<br>② 生理食塩水『ヒカリ』50ml フラッシュ用  |         |         |
| コメント                            | Pembrolizumab+CBDCA+5-FU療法は6コースまで。<br>診療科登録制(リスト参照)   |         |         |

| プロトコールに関する解説        |
|---------------------|
| プロトコールに関する解説はありません。 |