

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
切除不能進行再発頭頸部癌 Cmab+CBDCA+5-FU療法		21日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
d1	イメンドカプセル125mg 抗がん薬投与の1時間～1時間半前に内服		
d1,8,15	レスタミン錠10mg 5錠		
d1	本管 ① 生食50mL プライミング用 ② <b>フルオロウラシル</b> 1,000mg/m <sup>2</sup> +生食500mL Cmab、CBDCA投与終了後に開始 側管 ① デキサート6.6mg+生食100mL 点滴開始と同時にレスタミン錠10mg 5T内服 ② <b>アービタックス</b> 400mg/m <sup>2</sup> +生食500mL (②)(* 2コース目以降は、 <b>アービタックス</b> 250mg/m <sup>2</sup> +生食250mL) ③ 生食50mL フラッシュ用 ④ グラニセトロンバッグ1mg ⑤ <b>カルボプラチン</b> AUC 5+生食250mL ⑥ 生食50mL フラッシュ用		
d2-3	① <b>フルオロウラシル</b> 1,000mg/m <sup>2</sup> +生食500mL		
d4	① <b>フルオロウラシル</b> 1,000mg/m <sup>2</sup> +生食500mL ② 生食50mL フラッシュ用		
d8,15	① 生食100mL+デキサート6.6mg 点滴開始と同時にレスタミン錠10mg 5T内服 ② <b>アービタックス</b> 250mg/m <sup>2</sup> +生食250mL ③ 生食50mL フラッシュ用		
コメント	アービタックス投与30分前にレスタミン5T内服 Day2,3にイメンド80mg内服		

プロトコールに関する解説
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>