プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
DLBCL Pola-R-CHP療法(C1)		21日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
day1	① プレドニン注100mg + 生食50mL ② 生食50mL(フラッシュ用) ③ リツキシマブBS 375mg/m ² + 生食* 点滴開始30分前にカロナール錠200mg2錠、 レスタミンコーワ錠10mg5錠内服。 * 初回投与 最終濃度1mg/mLになるように調製。 投与速度50mL/hで開始し、 30分毎に50mL/hずつ増量(最大400mL/h)。 ④ 生食50mL(フラッシュ用)		
day2	① パロノセトロン0.75mg + プレドニン注100mg + 生食50mL ② 生食50mL(フラッシュ用) ③ ポライビー 1.8mg/kg + 生食100mL 点滴開始30分前にカロナール錠200mg2錠、 レスタミンコーワ錠10mg5錠内服。 点滴静注用30mg:注射用水1.8mL、 点滴静注用140mg:注射用水7.2mLで溶解。 溶解後の濃度は20mg/mL 希釈後の濃度は0.72~2.7mg/mLとなるようにすること。 投与時は0.2又は0.22 μmインラインフィルターを使用。 調製後4時間以内に投与終了。 ④ 生食50mL(フラッシュ用) ⑤ ドキシソルビン 50mg/m ² + 生食100mL ⑥ エンドキサン 750mg/m ² + 生食250mL ⑦ 生食50mL(フラッシュ用)		
day3-5	① プレドニン 100mg/body 1日1回朝食後		
day1	前投薬 カロナール錠200mg 2錠 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 リツキシマブ投与30分前に内服		
day2	カロナール錠200mg 2錠 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 ポライビー投与30分前に内服		
コメント	d1-5:PSL100mg/d投与。RTX/Pola投与30分前にカロナール400mg、レスタミン50mg内服。		

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。