

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
DLBCL Pola-R-CHP療法(C7-8)		21日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
day1	① 生食50mL(プライミング用) ② リツキシマブBS 375mg/m ² + 生食250mL 点滴開始30分前にカロナール錠200mg2錠、 レスタミンコーワ錠10mg5錠内服。 * 初回投与 最終濃度1mg/mLになるように調製。 投与速度50mL/hで開始し、 30分毎に50mL/hずつ増量(最大400mL/h)。 * 2回目以降 最終濃度1mg/mLになるように調製。 投与速度100mL/hで開始し、 30分毎に100mL/hずつ増量(最大400mL/h)。 * 2回目以降で臨床的に重篤な心疾患がなく、 初回投与時に発現した副作用が軽微であり、 かつ投与前の末梢血リンパ球数が5,000/ μ L未満の場合 総液量250mLになるように調製。 希釈濃度は1~4mg/mL 投与速度100mL/hで開始し、 30分後に200mL/hに増量。 ③ 生食50mL(フラッシュ用)		
day1	前投薬 カロナール200mg錠 2錠 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 リツキシマブ投与30分前に内服		
コメント	RTX投与30分前にカロナール400mg、レスタミン50mg内服。		

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。