

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
濾胞性リンパ腫 G-Benda療法(C2-6)		28日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
day1	1) デキサート 6.6 mg + 生食 50 mL 2) 生食 50 mL(フラッシュ用) 3) <b>ガザイバ</b> 1000 mg + 生食 210 mL (計 250 mL) <1サイクル目の投与でGrade3以上のinfusion reactionが 発現しなかった場合> 25mL/hで開始し、30分後に225mL/hに増量 (30分後の投与速度は最大225mL/hまでの範囲で変更可)。 0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用 点滴開始30分前までにカロナール錠500mg2錠と レスタミン錠10mg5錠内服 4) 生食 50 mL(フラッシュ用) イメンドカプセル125mg トレアキシシ投与開始1時間～1時間半前に内服 5) アロキシシ0.75mg + 生食 50 mL 6) <b>トレアキシシ</b> 90 mg/m <sup>2</sup> + 生食 / 計 500 mL 生食で500mLとなるように調整する。 調製後6時間以内に投与を終了する。 7) 生食 50 mL(フラッシュ用)		
day2	1) デキサート 6.6 mg + 生食 50 mL 2) <b>トレアキシシ</b> 90 mg/m <sup>2</sup> + 生食 / 計 500 mL 生食で500mLとなるように調整する。 調製後6時間以内に投与を終了する。 3) 生食 50 mL(フラッシュ用)		
コメント	day2,3にイメンド80mg1Cap内服。ガザイバ点滴開始30分前までにカロナール錠500mg2錠とレスタミン錠10mg5錠内服。6コースまで。		

プロトコールに関する解説	
プロトコールに関する解説はありません。	