

| プロトコール名                     |  | 1クールの日数 | 放射線治療   |
|-----------------------------|--|---------|---------|
| 多発性骨髄腫 Kd療法(once weekly) C1 |  | 28 日    | ■なし □あり |
| 投与日                         | 薬品名(※赤字は抗がん薬)  |         |         |
| day1                        | ① 5%ブドウ糖 50ml(プライミング用)<br>② <b>カイプロリス</b> 20mg/sq + 5%ブドウ糖 100ml<br>10mg/Vは注射用水5mLで溶解、40mg/Vは注射用水20mLで溶解。<br>溶解後の濃度は2mg/mL。<br>③ 5%ブドウ糖 50ml(フラッシュ用) |         |         |
| day8,15                     | ① 5%ブドウ糖 50ml(プライミング用)<br>② <b>カイプロリス</b> 70mg/sq + 5%ブドウ糖 100ml<br>10mg/Vは注射用水5mLで溶解、40mg/Vは注射用水20mLで溶解。<br>溶解後の濃度は2mg/mL。<br>③ 5%ブドウ糖 50ml(フラッシュ用) |         |         |
| day1,8,15,22                | レナデックス錠 40mg   |         |         |
| コメント                        | day1,8,15,22 レナデックス錠40mg経口投与。<br>カイプロリス:BSA>2.2m <sup>2</sup> →2.2m <sup>2</sup> で計算。Ccr<15→休薬。  |         |         |

| プロトコールに関する解説        |
|---------------------|
| プロトコールに関する解説はありません。 |