

| プロトコール名                           |   | 1クールの日数 | 放射線治療   |
|-----------------------------------|---|---------|---------|
| 急性リンパ性白血病 イノズマブ オゾガマイシン療法(1サイクル目) |   | 21日     | ■なし □あり |
| 投与日                               | 薬品名(※赤字は抗がん薬)   |         |         |
| day1                              | ① ソルコーテフ 200mg + 生食50ml<br>② グラニセトロン点滴静注バック1mg<br>③ 生食50mL(フラッシュ用)<br>④ <b>ベスポンサ</b> 0.8mg/m <sup>2</sup> + 生食(総液量 50mlとなるように調整)<br>1バイアル当たり4mLの注射用水で溶解<br>⑤ 生食50mL(フラッシュ用) |         |         |
| day8, 15                          | ① ソルコーテフ 200mg + 生食50ml<br>② グラニセトロン点滴静注バック1mg<br>③ 生食50mL(フラッシュ用)<br>④ <b>ベスポンサ</b> 0.5mg/m <sup>2</sup> + 生食(総液量 50mlとなるように調整)<br>1バイアル当たり4mLの注射用水で溶解<br>⑤ 生食50mL(フラッシュ用) |         |         |
| コメント                              | ベスポンサ投与開始30分前に、カロナール(200)2錠とd-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mgを服用。   |         |         |

| プロトコールに関する解説        |
|---------------------|
| プロトコールに関する解説はありません。 |