

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
急性リンパ性白血病 イノズマブ オゾガマイシン療法(2-6サイクル目)		28日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
day1	① ソルコーテフ 200mg + 生食50ml ② グラニセトロン点滴静注バック1mg ③ 生食50mL(フラッシュ用) ④ ベスポンサ 0.5mg/m ² + 生食(総液量 50mlとなるように調整) 1バイアル当たり4mLの注射用水で溶解 遮光 前コースで寛解しなかった場合には投与量を0.8mg/m ² とする ④ 生食50mL(フラッシュ用)		
day8, 15	① ソルコーテフ 200mg + 生食50ml ② グラニセトロン点滴静注バック1mg ③ 生食50mL(フラッシュ用) ④ ベスポンサ 0.5mg/m ² + 生食(総液量 50mlとなるように調整) 1バイアル当たり4mLの注射用水で溶解 遮光 ⑤ 生食50mL(フラッシュ用)		
コメント	ベスポンサ投与開始30分前に、カロナール(200)2錠とd-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mgを服用。		

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。