

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
慢性リンパ性白血病 R-bendamustine療法(C1)		28日	■なし □あり
投与日	薬品名 (※赤字は抗がん薬)		
day1	イメンドカプセル125mg 抗がん薬投与の1時間～1時間半前に内服  1) デキサート 6.6 mg + 生食 50mL 2) 生食 50mL(フラッシュ用) 3) <b>リツキシマブ</b> 375 mg/m <sup>2</sup> + 生食 最終濃度は1mg/mLに調製 点滴開始30分前にカロナール200mg2錠と d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mgを1錠内服。 生食で10倍希釈する。 * 初回投与 投与速度50mL/hで開始し、30分毎に50mL/hずつ増量 最大400mL/h * 2回目以降 投与速度100mL/hで開始し、30分毎に100mL/hずつ増量 最大400mL/h 4) 生食 50mL(フラッシュ用) 5) アロキシ 0.75mg + 生食 50mL 6) <b>トリアキシシン</b> 90 mg/m <sup>2</sup> + 生食 / 計500mL 7) 生食 50mL(フラッシュ用)		
day2	1) デキサート 6.6 mg + 生食 50mL 2) <b>トリアキシシン</b> 90 mg/m <sup>2</sup> + 生食 / 計500mL 3) 生食 50mL(フラッシュ用)		
コメント	1コース目限定。 リツキシマブ投与開始30分前にカロナール錠200mgを2錠とd-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mgを1錠内服。 Day2、3にイメンド80mg内服。		

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。