

| プロトコール名 | | 1クールの日数 | 放射線治療 |
|----------------------------------|--|---------|---------|
| 慢性リンパ性白血病 R-bendamustine療法(C2以降) | | 28日 | ■なし □あり |
| 投与日 | 薬品名 (※赤字は抗がん薬) | | |
| day1 | イメンドカプセル125mg 抗がん薬投与の1時間～1時間半前に内服 1) デキサート 6.6 mg + 生食 50mL 2) 生食 50mL(フラッシュ用) 3) リツキサン 500 mg/m ² + 生食 最終濃度は1mg/mLに調製 点滴開始30分前にカロナール200mg2錠と d-クロルフェニラミンレイン酸塩徐放錠6mgを1錠内服。 生食で10倍希釈する。 * 初回投与 投与速度50mL/hで開始し、30分毎に50mL/hずつ増量 最大400mL/h * 2回目以降 投与速度100mL/hで開始し、30分毎に100mL/hずつ増量 最大400mL/h 4) 生食 50mL(フラッシュ用) 5) アロキシ 0.75mg + 生食 50mL 6) トリアキシン 90 mg/m ² + 生食 / 計500mL 7) 生食 50mL(フラッシュ用) | | |
| day2 | 1) デキサート 6.6 mg + 生食 50mL 2) トリアキシン 90 mg/m ² + 生食 / 計500mL 3) 生食 50mL(フラッシュ用) | | |
| コメント | 2コース目以降。(C1含め最大6コース) リツキシマブ投与開始30分前にカロナール錠200mgを2錠とd-クロルフェニラミンレイン酸塩徐放錠6mgを1錠内服。 Day2、3にイメンド80mg内服。 | | |

| プロトコールに関する解説 |
|---------------------|
| プロトコールに関する解説はありません。 |