

登録番号	プロトコール名			
C16-44	胃癌 術後CapeOX療法			
診療科	腫瘍内科	1クールの日数	21日	
審査日	2016年5月30日	所要時間	140分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	胃癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input type="checkbox"/> 進行・再発、 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	カペシタビン(ゼローダ)・Cape	2000 mg/m2*	po	d1-14
2	オキサリプラチン(エルプラット)・I-OHP	130 mg/m2	div	d1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Bang YJ, Kim YW, Yang HK et al. Adjuvant capecitabine and oxaliplatin for gastric cancer after D2 gastrectomy (CLASSIC): a phase 3 open-label, randomised controlled trial. Lancet 2012; 379: 315-321.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	*Capeは1日2回、d1-14(po)。BSA 1.36>(1.2g/回)、1.36≤(1.5g/回)、1.66≤(1.8g/回)、1.96≤(2.1g/回)			

プロトコールに関する解説
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
胃癌 術後CapeOX療法		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1	① アロキシ 0.75mg+デキサート 6.6mg+大塚糖液5% 50mL ② エルプラット 130mg /m2+5%糖液 500mL ③ 5%糖液 50mL(フラッシュ用)	div div div	15分 120分 5分
d1-14	ゼローダ 2000mg/m2で内服		
プロトコール 適応時 表示コメント	Capeは1日2回、d1-14(po)。BSA 1.36>(1.2g/回)、1.36≤(1.5g/回)、1.66≤(1.8g/回)、1.96≤(2.1g/回)		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄:)		