

登録番号	プロトコール名			
C25-20	膵癌 nab-PTX+GEM療法			
診療科	腫瘍内科、総合外科	1クールの日数	28日	
審査日	2015年1月26日	所要時間	90分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	膵癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> 超大量、 <input type="checkbox"/> 遺伝子、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	ナブパクリタキセル(アブラキサン)・nab-PTX	125 mg/m ²	d.i.v.	d1, d8, d15
2	ゲムシタビン(ジェムザール)・GEM	1000 mg/m ²	d.i.v.	d1, d8, d15
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Von Hoff DD, et al : Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med 2013;369:1691-1703.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
膵癌 nab-PTX+GEM療法		28日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1, 8, 15	① 生食 50mL+デキサート6.6mg+アロキシシ 0.75mg ② 生食 50mL (フラッシュ) ③ 生食 20mL/m2+ アブラキサン 125mg/m2 払出容器は、100mLボトル 最終濃度は5mg/mL インラインフィルター不可 ④ 生食 50mL (フラッシュ) ⑤ 生食 100mL+ ジェムザール 1000mg/m2 ⑥ 生食 50mL (フラッシュ)	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	15分 5分 30分 5分 30分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント			
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄:)		