

登録番号	プロトコール名				
C34206A1	肺癌(扁平上皮) CBDCA・PTX+ペムブロリズマブ療法				
診療科	呼吸器内科	1クールの日数	21日		
審査日	2021年9月27日	所要時間	320分	適応外使用	■なし □あり
適応病名	肺癌(扁平上皮)	放射線療法	■なし □あり		
実施部署	■外来 ■病棟 □その他( )				
適応分類	□初発 ■進行・再発 □術後補助 □術前補助 □その他( )				
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)	
1	カルボプラチン(カルボプラチン)	AUC6	div	d1	
2	パクリタキセル(パクリタキセル)	200mg/m <sup>2</sup>	div	d1	
3	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	200mg	div	d1	
4					
5					
6					
7					
8					
エビデンスレベル	■治療 (エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5 □6 )				
ガイドライン文献名	Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer, Paz-Ares L, et al., N Engl J Med. 2018 Sep 25. 肺癌診療ガイドライン2020				
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	4サイクル実施後、ペムブロリズマブ単独療法に移行。				

プロトコールに関する解説	

# がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
肺癌(扁平上皮) CBDCA・PTX+ペムブロリズマブ療法		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1	① 生理食塩水50mL(プライミング用) ② 生理食塩水 50mL+キイトルーダ200mg 0.22 $\mu$ mインラインフィルター使用 ③ 生理食塩水50mL(フラッシュ用) ④ グラニセトロン点滴静注バッグ1mg+デキサート9.9mg+ファモチジン20mg 点滴開始と同時にレスタミン錠10mgを5錠内服 ⑤ 生理食塩水100mL ⑥ 生理食塩水500mL+パクリタキセル200mg/m2 0.22 $\mu$ mインラインフィルター使用 ⑦ 5%ブドウ糖液250mL+カルボプラチン(AUC6) ⑧ 生理食塩水50mL(フラッシュ用)	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	— 30分 5分 10分 30分 180分 60分 5分
day1	① アブレピタントカプセル125mg 抗がん薬投与1時間～1時間30分前に内服 ② レスタミンコーワ錠10mg5錠 ④の制吐剤開始と同時に内服	経口 経口	
プロトコール 適応時 表示コメント	Day2,3朝食後にアブレピタント80mg内服。4サイクル実施後、ペムブロリズマブ単独療法に移行。		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄: )		