

登録番号	プロトコール名			
C43-12	悪性黒色腫ダブラフェニブ・トラメチニブ併用療法			
診療科	皮膚科	1クールの日数	14日	
審査日	2016年12月26日	所要時間	-	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	根治切除不能悪性黒色腫	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他( )			
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他( )			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	ダブラフェニブ(タフィンラーカプセル)	300mg	内服	d1～d14
2	トラメチニブ(メキニスト錠)	2mg	内服	d1～d14
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 )			
ガイドライン文献名	N Engl J Med 372:30-9. N Engl J Med 371:1877-88. Lancet 386:444-51.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	添付文書に記載に従い、各種副作用に対して適宜減量もしくは休薬を行う。			

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

# がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
悪性黒色腫ダブラフェニブ・トラメチニブ併用療法		14日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1-14	① <b>タフィンラーカプセル</b> 150mg (朝 空腹時) ② <b>メキニスト錠</b> 2mg (朝 空腹時) ③ <b>タフィンラーカプセル</b> 150mg (夕 空腹時)  用量調節 ・タフィンラーカプセル 通常投与量: 1回150mg(1日2回) 1段階減量: 1回100mg(1日2回) 2段階減量: 1回75mg(1日2回) 3段階減量: 1回50mg(1日2回) 4段階減量: 投与中止 ・メキニスト錠 通常投与量: 1回2mg(1日1回) 1段階減量: 1回1.5mg(1日1回) 2段階減量: 1回1mg(1日1回) 3段階減量: 投与中止	内服 内服 内服	— — —
プロトコール 適応時 表示コメント			
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄: )		