

登録番号	プロトコール名			
C43-018A	悪性黒色腫 Nivo+Ipi療法			
診療科	腫瘍内科、皮膚科	1クールの日数	21日	
審査日	2018年 7月 30日	所要時間	95分	適応外使用 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	未治療悪性黒色腫	放射線療法	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与法	投与日(d1、d8等)
1	Nivolumab(オプジーボ)・Nivo	80 mg	div	d1
2	Ipilimumab(ヤーボイ)・Ipi	3 mg/kg	div	d1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Larkin et al. 2015 NEJM 373:23-34. Wolchok et al. 2017 NEJM 377:1345-1356.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	減量・増量不可 計4クール実施し、Nivo 240mg単独 q2wへ移行。			

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
悪性黒色腫 Nivo+Ipi療法		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
第1日目	① 生食50mL(プライミング用) ② 生食30mL + オプジーボ80mg 最終濃度は0.35mg/mL以上となるよう調製 CVポート又はPICCから投与する場合、 希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上となるように調製 ※※※0.2または0.22 μ mインラインフィルター使用 ③ 生食100mL 30分以上かけて投与 ④ 生食50mL + ヤーボイ3mg/kg 最終濃度は1~4 mg/mL ※※※0.2-1.2 μ mインラインフィルター使用 ⑤ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射	— 30分 30分 30分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント	計4クール実施し、Nivo 240mg単独、2週毎投与へ移行。		
照射併用時 照射線量			