

|                               |   |         |   |   |
|-------------------------------|---|---------|---|---|
| 登録番号                          | プロトコール名   |         |   |   |
| C43-007A                      | 悪性黒色腫イピリムマブ療法   |         |   |   |
| 診療科                           | 腫瘍内科  | 1クールの日数 | 21日   |   |
| 審査日                           | 2015年 10月 26日   | 所要時間    | 35分   | 適応外使用 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり |
| 適応病名                          | 悪性黒色腫   | 放射線療法   | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり |   |
| 実施部署                          | <input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他( )   |         |   |   |
| 適応分類                          | <input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他( )   |         |   |   |
| 番号                            | 抗がん薬名   | 1日投与量   | 投与方法  | 投与日(d1、d8等)   |
| 1                             | イピリムマブ(ヤーボイ)  | 3mg/kg  | d.i.v   | d1  |
| 2                             |   |         |   |   |
| 3                             |   |         |   |   |
| 4                             |   |         |   |   |
| 5                             |   |         |   |   |
| 6                             |   |         |   |   |
| 7                             |   |         |   |   |
| 8                             |   |         |   |   |
| エビデンスレベル                      | <input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 ) |         |   |   |
| ガイドライン文献名                     | N Engl J Med. 2010 Aug 19;363(8):711-23. doi: 10.1056/NEJMoa1003466. Epub 2010 Jun 5.   |         |   |   |
| その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など) | G2の副作用(皮膚障害、内分泌障害をのぞく)、G3の皮膚障害、症候性の内分泌障害はG1になるまで投与延期。G3の副作用、局所的な免疫抑制療法が有効でないG2以上の眼障害、G4の皮膚障害は投与中止<br>臨床試験においてイピリムマブの投与に関連した死亡例も報告されており、処方医登録制とされている。使用に当たっては注意が必要。<br>4コース目まで投与可。   |         |   |   |

|                            |
|----------------------------|
| プロトコールに関する解説               |
| <p>プロトコールに関する解説はありません。</p> |

# がん化学療法処方

| プロトコール名                 |   | 1クールの日数              |                |
|-------------------------|---|----------------------|----------------|
| 悪性黒色腫イピリムマブ療法           |   | 21日                  |                |
| 投与日                     | 薬品名(※赤字は抗がん薬)   | 投与経路                 | 投与時間           |
| day1                    | ① 生食50mL(プライミング用)<br>② ヤーボイ 3mg/kg + 生食50mL<br>0.2~1.2 μ mのインラインフィルターを用いて投与<br>③ 生食50mL(フラッシュ用) | 点滴静注<br>点滴静注<br>点滴静注 | -<br>30分<br>5分 |
| プロトコール<br>適応時<br>表示コメント | 4コース目まで投与可。<br>イピリムマブは1~4mg/mLとなるよう希釈する。  |                      |                |
| 照射併用時<br>照射線量           |   |                      |                |