

登録番号	プロトコール名			
C53-36	子宮頸癌パクリタキセル・シスプラチン+ベバシズマブ療法			
診療科	婦人科	1クールの日数	21日	
審査日	2016年9月26日	所要時間	1440分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	子宮頸癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他( )			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他( )			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	パクリタキセル(タキソール)・T	135mg/m2	div	d1
2	シスプラチン(シスプラチン/ランダ)・P	50mg/m2	div	d2
3	ベバシズマブ(アバスタチン)・Bev	15mg/kg	div	d2
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 )			
ガイドライン文献名	Improved Survival with Bevacizumab in Advanced Cervical Cancer Krishnansu S. Tewari et al. NEJM 2014			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

## がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
子宮頸癌パクリタキセル・シスプラチン+ベバシズマブ療法		21日	
投与日	薬品名（※赤字は抗がん薬）	投与経路	投与時間
day1	レストミン(10)5T Rp.1点滴開始と同時に内服 ① 生食50mL+アロキシ0.75mg+デキサート13.2mg+ガスター20mg ② 生食100mL ③ 5%glu250mL+PTX(67.5mg/m <sup>2</sup> ) インラインフィルターを使用する ④ 5%glu250mL+PTX(67.5mg/m <sup>2</sup> )	内服 — 点滴注射 10分 点滴注射 30分 点滴注射 12時間 点滴注射 12時間	— 10分 30分 12時間 12時間
day2	イメンドカプセル125mg シスプラチン投与の60~90分前 ① 生食1000mL+MgSO4 8mEq 前日のパクリタキセル持続点滴終了の4時間前から投与開始 ② 生食50mL(フラッシュ) ③ 生食100mL+ベバシズマブ 15mg/kg 初回投与で問題がなければ2回目以降60分に短縮可。 さらに問題がなければ、その次回以降30分に短縮可。 ④ 生食50mL(フラッシュ) ⑤ 生食50mL+デキサート9.9mg ⑥ 生食350mL+CDDP(50mg/m <sup>2</sup> ) ⑦ フロセミド20mg CDDP終了後、側管から ⑧ ソルデム3A 500mL ⑨ ソルデム3A 500mL ⑩ ソルデム3A 500mL ⑪ ソルデム3A 500mL	内服 — 点滴注射 4時間 点滴注射 5分 点滴注射 90分 点滴注射 5分 点滴注射 15分 点滴注射 2時間 静注 — 点滴注射 1時間 点滴注射 1時間 点滴注射 1時間 点滴注射 1時間	— 4時間 5分 90分 5分 15分 2時間 — 1時間 1時間 1時間 1時間
day3	① 生食50mL+デキサート6.6mg ② ソルデム3A 500mL ③ ソルデム3A 500mL ④ ソルデム3A 500mL ⑤ ソルデム3A 500mL	点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射	15分 1時間 1時間 1時間 1時間
プロトコール 適応時 表示コメント	day1Rp.1開始と同時にレストミン内服。 day2シスプラチン投与の60~90分前にイメンドカプセル125mg内服、day3-4イメンドカプセル80mg朝食後内服。 ベバシズマブのinfusion reactionが生じなければ2サイクル目は60分、さらに3回目以降は30分まで投与時間を短縮可。		
照射併用時 照射線量	グレイ（備考欄: )		