

登録番号	プロトコール名			
C54-23	子宮内膜癌・子宮肉腫 ドキソルビシン単剤療法			
診療科	婦人科	1クールの日数	21日	
審査日	2013年10月28日	所要時間	50分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	子宮体癌、子宮肉腫		放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> 超大量、 <input type="checkbox"/> 遺伝子、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	ドキソルビシン(アドリアシン)Dox	60mg/m ²	d.i.v.	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	NCCNガイドライン、Cancer. 1983 Aug 15;52(4):626-32. A randomized study of adriamycin with and without dimethyl triazenoimidazole carboxamide in advanced uterine sarcomas. Omura GA, Major FJ, Blessing JA, Sedlacek TV, Thigpen JT, Creasman WT, Zaino RJ.Cancer. 1985 Apr 15;55(8):1648-53. Treatment of recurrent or advanced uterine sarcoma. A randomized trial of doxorubicin versus doxorubicin and cyclophosphamide (a phase III trial of the Gynecologic Oncology Group). Muss HB, Bundy B, DiSaia PJ, Homesley HD, Fowler WC Jr, Creasman W, Yordan E.			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	添付文書では併用療法となっておりますが、腎障害、PS不良など併用が困難な症例が対象。総投与量は500mg/m ² まで。有害事象に従って、50mg/m ² 、40mg/m ² まで減量。 d2、d3にデカドロン錠8mg/日内服			

プロトコールに関する解説
プロトコールに関する解説はありません。

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
子宮内膜癌・子宮肉腫 ドキソルビシン単剤療法		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1	① アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg+生食50mL ② アドリアシン 60mg/m ² +5%ブドウ糖100mL ③ 生食50mL フラッシュ用	点滴静注 点滴静注 点滴静注	15分 30分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント	d2、d3にデカドロン錠8mg/日内服		
照射併用時 照射線量	グレイ(備考欄:)		