登録番号		プロトコール名								
C56-89		卵巣小細胞癌カルボプラチン+エトポシド療法								
診療科		婦人科			1クールの日数 21日					
審査日		2017年11月27日	所要時間	200分	適応外使用		■なし □あり			
適応病名		卵巣癌			放射線療	法	■なし □あり			
実施部署		□外来、■病棟、□その他()								
適応分類		□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□その他()								
番号		抗がん薬名		1日投与量	量 投与法 投与日(d1、d8等					
1	力ル	ボプラチン(カルボプラチン)・CBCDA AUC 5.0			div	d1				
2		エトポシド(エトポシド)・VP-16		100 mg/m2		div	d1-3			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
エビデンス レベル		■治療(エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5 □6)								
ガイドライン 文献名		Annals of Oncol. 4:697-699, 1993. Cancer Chemother Pharmacol. 27:389-393, 1991.								
その他 (減量・増 規定、プ コールに する補足 明など)	以開									
プロトコールに関する解説										
プロトコールに関する解説はありません。										

がん化学療法処方

	1クールの日数		
	卵巣小細胞癌カルボプラチン+エトポシド療法		
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1	イメンド125mg 抗がん薬投与の1時間~1時間半前に内服	内服	
day1	 ① グラニセトロンバッグ1mg+デキサメタゾン4.95mg ② 5%ブドウ糖500mL + エトポシド100mg/m² ③ 5%ブドウ糖250 mL + カルボプラチンAUC5.0 ④ 生食50mL(フラッシュ用) 	div div div div	15分 120分 60分 5分
day2, 3	 生食50mL+デキサート3.3mg 5%ブドウ糖500mL + エトポシド100mg/m² 生食50mL(フラッシュ用) 	div div div	15分 120分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント	Day2,3にイメンド80mg内服		
照射併用時 照射線量	グレイ(備考欄:)